

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut,Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avadako, Kivi	1. Çiçek öncesi 2. Pembe tomurcuk dönemi 3. Hasat sonrası ve yaprak dökümünden önce	100-200ml/100lt su
Bağ	1. Çiçeklenme öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	100-200ml/100lt su
Zeytin	1. Çiçeklenme öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	100-200ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz, Antep fıstığı, Badem Fındık	1. Çiçek öncesi 2. Pembe tomurcuk dönemi 3. Hasat sonrası ve yaprak dökümünden önce	100-200ml/100lt su
Ispanak, Pıras, Kereviz, Brokoli, Karnibahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	1. Yeterli yaprak alanı oluştuğunda 2. Çiçeklenme öncesi	75-150ml/dekara
Patates, Soğan, Sarımsak, Mercimek, Nohut	1. uygulama 6-8 yapraklı dönemde 2. uygulama 2-3 hafta sonra	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	1. Yeterli yaprak alanı oluştuğunda 2. Çiçeklenme öncesi	75-150ml/dekara
Çilek	1. Yeterli yaprak alanı oluştuğunda 2. Çiçeklenme öncesi	75-150ml/dekara
Kavun, Karpuz	1. Yeterli yaprak alanı oluştuğunda 2. Çiçeklenme öncesi	75-150ml/dekara
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	1. uygulama 6-8 yapraklı dönemde 2. uygulama 2-3 hafta sonra	100-200 ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	1. 5-7 yapraklı devrede 2. Çiçeklenme sonrası	75-150ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Gelişme döneminde 15 gün ara ile 2 uygulama	75-150ml/100 lt su

OMEX

AGRIFLUIDS
EC FERTILIZER

Adept Boron

Boron Etanolamin

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

w/w

%11

pH : 7 - 9

Klor içeriği : % 0.2

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Korumacı eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 11243

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.

Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.

Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama,hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

