

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Narenciye, Çay, Muz	Çiçek dökümünün %80 gerçekleştiği dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Çiçek dökümünün %80 gerçekleştiği dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçek dökümünün %80 gerçekleştiği dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nectarin, Kiraz, Vişne	Meyve oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Şaşırtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftalık iken başlanır, 15 gün ara ile 3-4 uygulama	125-250ml/100lt su
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Bitki boyu 10-15cm den itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/100lt su
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnibahar, Lahana, Pırasa, Maydonoz, Enginar	Erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/100lt su
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak, Nohut, Mercimek	Erken Gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/100lt su
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	6-8 yapraklı dönemde tek uygulama	125-250ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardeşlenme öncesi ve sonrası 2 uygulama, Mısırdaki gelişme devresinde 2 uygulama	125-250ml/dekara
Süs Bitkileri, Çim	Gelişme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	150-300ml/100lt su
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	Şaşırtmadan sonra başlanır, 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Çilek	İlk tomurcuklar görüldüğünde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Meyve oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI : Yukarıdaki bütün bitkiler için 1-2 lt/da

OMEX

AGRIFLUIDS

EC FERTİLİZER

Adept Citrus MnZn

Mangan (Mn-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Suda Çözünür Mangan (Mn) %4
Suda Çözünür Çinko (Zn) %3
Klor (Cl): %0.3
pH: 5.0

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 2022TK2903

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı +5 / + 40°C.

KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımdan emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ :

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG ENGLAND

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE

İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi

8001 Sokak No:2 Kemalpaşa İzmir

Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

