

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Ispanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Patates, Soğan, Sarımsak Mercimek, Nohut	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Çilek	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Kavun, Karpuz	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme döneminde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Sapa kalkma ve başaklanma döneminde 2 uygulama	100-200ml/dekara
TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI:		
Damlama sulama ile 1 lt/dekara dozda uygulama yapılır. Zamanı yapraktan uygulama ile aynıdır.		

OMEX

AGRIFLUIDS

EC FERTİLİZER

Adept K-33

3 - 0 - 33

NK Gübre Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

Üre Azotu (N)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

pH: 11 - 13

w/w

%3

%3

%33

Klor içeriği: < 0,5%



Tahriş Edici

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :

Hacim :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 35192

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.

Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.

Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG İNGİLTERE

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE

İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2

Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

