

## YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

| BİTKİ                                                                             | UYGULAMA ZAMANI                                                                    | DOZU                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elma, Armut, Kiraz, Vişne<br>Şeftali, Kayısı, Nektarin,<br>Erik, Avakado, Kivi    | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 150-300 ml/100 lt su |
| Bağ                                                                               | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 150-300 ml/100 lt su |
| Zeytin                                                                            | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 150-300 ml/100 lt su |
| Narenciye, Çay, Muz                                                               | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 150-300 ml/100 lt su |
| Antep fıstığı, Badem<br>Fındık                                                    | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 150-300 ml/100 lt su |
| Ispanak, Pırasa, Kereviz,<br>Brokoli, Karnabahar, Marul<br>Lahana, Enginar, Havuç | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama<br>15 gün ara ile 2-3 uygulama | 100-200 ml/dekara    |
| Patates, Soğan, Sarımsak,<br>Mercimek, Nohut                                      | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 100-200 ml/dekara    |
| Domates, Biber, Patlıcan,<br>Fasulye, Bezelye, Kabak,<br>Salatalık                | Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile<br>2-3 uygulama                        | 125-200 ml/dekara    |
| Çilek                                                                             | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 100-200 ml/dekara    |
| Kavun, Karpuz                                                                     | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama                                | 100-200 ml/dekara    |
| Şeker Pancarı,<br>Hayvan Pancarı                                                  | 6 yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama                                       | 100-200 ml/dekara    |
| Pamuk, Soya Fasulyesi,<br>Yer Fıstığı, Ayçiçeği,<br>Tütün, Kolza, Şerbetçiotu     | Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1 uygulama<br>(Pamukta tarak öncesi)        | 100-200 ml/dekara    |
| Buğday, Arpa, Çavdar,<br>Yulaf, Çeltik, Mısır                                     | Kardeşlenme döneminde 1-2 uygulama                                                 | 100-200 ml/dekara    |

**OMEX**  
AGRIFLUIDS  
EC FERTİLİZER

## Adept Magnesium

Magnezyum Nitrat Çözeltisi

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Nitrat Azotu (N)                   | w/w |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %6  |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)           | %9  |
|                                    | %1  |

pH : 4 - 6

Klor içeriği : % 0.2

### UYARILAR

- \* Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- \* Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Çocuklardan uzak tutunuz
- \* Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- \* Tıbbi yardım alınız.
- \* Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- \* Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- \* Koriyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- \* Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- \* Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :  
Hacim :

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 11241

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.  
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.  
Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,  
PE 34 3 AG İNGİLTERE  
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE  
İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2  
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR  
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

