

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Uyanma döneminden başlayarak çiçeklenmeye kadar 2 uygulama, daneler saçma iriliğinde iken 1 olmak üzere 3 uygulamaya	125-200ml/100lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve oluşum devresinde olmak üzere 3 uygulama	125-200ml/100lt su
Zeytin	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-200ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-200ml/100lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Kambahar, Lahana, Pırasa, Maydanoz, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Çimlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	100-150ml/dekar
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Kavun, Karpuz, Hiyar, Kabak	4-6 yaprak dönemden itibaren 15 gün arayla 2-3 uygulama	100-150ml/dekar
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Çiçek öncesi, çiçek ve meyve oluşum devresinde olmak üzere 2-3 uygulama	125-200ml/100lt su
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	4-6 yaprak devresi ilk uygulama 15 gün arayla 2 uygulama	100-150ml/dekar

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Damlama sulama ile 1-2 lt/dekar dozda uygulama yapılır. Uygulama zamanı yaprakdan uygulama ile aynıdır.

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept Minor

Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),
Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
pH: 5.5 - 7.5

w/w

%1
%1
%1

Klor içeriği: %1.20

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Korumacı eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No : 35191

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.
Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

