

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Patates, Soğan, Sarımsak, Mercimek, Nohut	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Kavun, Karpuz	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama	100-200ml/dekara

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept Phortify

0 - 20 - 20 + TE
PK Gübre Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) w/w %20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) %20
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) %0,1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) %0,1

Şelatin Stabil Kaldığı pH Aralığı : 3 - 12

Klor: %0.5

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 24042

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Net Ağırlık :
Hacim :