

### YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

| BİTKİ                                                                          | UYGULAMA ZAMANI                                                       | DOZU               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne      | İlk sürgünlerin görüldüğü dönemden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama | 100-200gr/100lt su |
| Bağ                                                                            | Çiçeklenme ve dane oluşumundan hemen önce olmak üzere 2 uygulama      | 100-200gr/100lt su |
| Zeytin                                                                         | Çiçeklenmeden önce 10 gün ara ile 2 uygulama                          | 100-200gr/100lt su |
| Narenciye, Çay, Muz                                                            | İlk sürgünlerin oluştuğu dönemden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama  | 100-200gr/100lt su |
| Antep fıstığı, Badem, Fındık                                                   | Yapraklanmayla beraber uygulamaya başlanır 10 gün ara ile 2 uygulama  | 100-200gr/100lt su |
| Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık                   | İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama            | 75-150gr/dekara    |
| İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar          | İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama            | 75-150gr/dekara    |
| Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek                                      | İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama            | 75-150gr/dekara    |
| Çilek                                                                          | Fide dikimden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama                      | 75-150gr/dekara    |
| Kavun, Karpuz                                                                  | Şaşırtmadan sonra başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama                | 75-150gr/dekara    |
| Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı                                                  | İlk gelişme döneminde 10 gün ara ile 3 uygulama                       | 75-150gr/dekara    |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu | Gelişme devresi boyunca 10 gün ara ile 2 uygulama                     | 75-150gr/dekara    |
| Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik                                            | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde olmak üzere 2 uygulama           | 75-150gr/dekara    |

### TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI (Damlama Sulama)

Topraktan sulama suyu ile 350-1250gr/dekar/gün olarak uygulanır.

Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme durumuna göre değişiklik gösterir.



## Adept Power

### PK Gübresi Harmanlanmış 0 - 52 - 34

#### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | %52 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                          | %51 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                                           | %34 |

w/w

### UYARILAR

- \* Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- \* Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Çocuklardan uzak tutunuz
- \* Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- \* Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- \* Tıbbi yardım alın.
- \* Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- \* Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- \* Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- \* Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :

Üretim Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.  
Şarj No'su :  
Lisans No : 564  
Tescil No : 31823

#### DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

#### KARIŞABİLİRLİK :

**Adept Power 0-52-34**, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımın emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

#### FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept Power 0-52-34** 'ün bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,  
PE 34 3 AG ENGLAND  
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

#### İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI  
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler  
Karşıyaka / İZMİR  
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

