

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/da
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado Kivi, Nectarin, Kiraz	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300gr/100lt su
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Maydanoz, Enginar	Geç dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/da
Patates, Havuç, Soğan, Nohut, Mercimek	Hasattan 5-6 hafta önce 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/da
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı dönemden itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/da
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/da
Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Pamuk Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme devresi boyunca 3 uygulama	125-250gr/da
Buğday, Arpa, Mısır, Yulaf, Çeltik, Çavdar	Sapa kalkma ve başaklanma döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/da
Antep Fıstığı, Badem, Fındık	İlkbahar devresinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300gr/100lt su
Çilek	Gelişme devresi boyunca 2-3 uygulama	125-250gr/da

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Topraktan sulama suyu ile 350-1250 gr/da / gün olarak uygulanır. Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme dönemine göre değişiklik gösterir.

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTILIZER

Adept Power

NPK Gübresi Harmanlanmış

11-9-16+(13CaO)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Toplam Azot (N)	%11
Nitrat Azotu (N)	%11
Nötral Amounyum Sitratta ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%16
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%13

Klor: %0.5

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Koriyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık:

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 34105

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünler ile karıştırmayınız. Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orjinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG ENGLAND

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI

SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sokak No:2/1 A Blok Kat : 1 D:2

35600-Bahçelievler - Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

