

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kırz, Vişne	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100 lt su
Bağ	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100 lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100 lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	İlkbahar döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar, Havuç	Geç dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/dekara
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Hasattan 5-6 hafta önce 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	150-300gr/100 lt su
Çilek	Gelişme döneminde 2-3 uygulama	125-250gr/dekara
Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/ 100 lt su
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 10 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren başlayarak 15 gün ara ile 3 uygulama	125-250gr/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Sapa kalkma ve başaklanma döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250gr/dekara

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU (Damlama Sulama)

Topraktan sulama suyu ile 350-1250gr/dekar/gün olarak uygulanır.

Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme durumuna göre değişiklik gösterir.

OMEX

AGRIFLUIDS

EC FERTİLİZER

Adept Power

12-0-24+(6MgO)(13SO₃)

NK Gübresi Harmanlanmış

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%12
Nitrat Azotu (N)	%6.5
Amonyum Azotu (N)	%5.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%6
Toplam Kükürt Trioksit (So ₃)	%13

w/w

Klor: %0.5

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 13001

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.

Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.

Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG İNGİLTERE

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE

İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2

Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Net Ağırlık :