

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut,Kiraz,Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi	İlk sürgünlerin görüldüğü dönemden itibaren10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100lt su
Bağ	Çiçeklenme ve dane oluşumundan hemen önce olmak üzere 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Zeytin	Çiçeklenmeden önce 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	İlk sürgünler oluştuğu dönemden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
A.Fıstığı, Badem, Fındık	Yapraklanmayla beraber uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak Salatalık	İlk gelişme döneminde başlanarak 10 gün ara ile 3 uygulama	75-150 gr/dekara
Ispanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	75-150 gr/dekara
Patates, Soğan, Sarımsak, Mercimek, Nohut,	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	75-150 gr/dekara
Çilek	Fide dikiminden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama	75-150gr/dekara
Kavun, Karpuz	İlk gelişme döneminden başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	75-150 gr/dekara
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	İlk gelişme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	75-150 gr/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu,	Gelişme devresi boyunca 10 gün ara ile 2 uygulama	75-150 gr/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde olmak üzere 2 uygulama	75-150 gr/dekara

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU (Damlama Sulama)

Topraktan sulama suyu ile 350-1250 gr/da / gün olarak uygulanır. Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme dönemine göre değişiklik gösterir.



Adept Power 15-30-15 (8SO₃)

NPK Gübresi Harmanlanmış

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot (N)	%15
Nitrat Azotu (N)	%3.6
Amonyum Azotu (N)	%8.4
Üre Azotu (N)	%3
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%15
Toplam Kükürt Trioksit (So ₂)	%8

Biüresi düşüktür.

Klor: %0.5

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık:

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 12997

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama,hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

