

## YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLAR

| BİTKİ                                                                        | UYGULAMA ZAMANI                                                                         | DOZU                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elma, Armut,Kiraz,Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi      | İlkbaharda gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama           | 125-250 gr/100lt su  |
| Bağ                                                                          | Çiçeklenmeden önce1.uygulama, Meyve tutumundan sonra 2.uygulama 15 gün sonra 3.uygulama | 125-250 gr/100 lt su |
| Zeytin                                                                       | Bitki gelişim dönemlerinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                  | 125-250 gr/100 lt su |
| Narenciye, Çay, Muz                                                          | İlkbaharda gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama           | 125-250 gr/100 lt su |
| A.Fıstığı, Badem, Fındık                                                     | Yapraklanma ile başlanır.15-20 gün ara ile 2-3 uygulama                                 | 125-250 gr/100 lt su |
| İspanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç | Ekimden yaklaşık3 hafta sonraerken gelişme dönemlerinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama     | 100-200 gr/dekara    |
| Patates, Soğan, Sarımsak, Mercimek, Nohut,                                   | Erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                     | 100-200 gr/dekara    |
| Domates,Biber,Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık                   | Şaşırtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftalık iken başlanır.15 gün ara ile 2-3 uygulama  | 100-200 gr/dekara    |
| Çilek                                                                        | İlk tomurcuklar görüldüğünde 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama                              | 100-200 gr/dekara    |
| Kavun, Karpuz                                                                | Şaşırtmadan sonra başlanır. 15 gün ara 2-3 uygulama                                     | 100-200 gr/dekara    |
| Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı                                                | Gelişme devresinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                | 100-200 gr/dekara    |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu      | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama           | 100-200 gr/dekara    |
| Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf, Çeltik, Mısır                                    | Kardeşlenme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama                  | 100-200 gr/dekara    |

## TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU (Damlama Sulama)

Topraktan sulama suyu ile 350-1250 gr/da / gün olarak uygulanır. Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme dönemine göre değişiklik gösterir.



# Adept Power 20-20-20 (5SO<sub>3</sub>)

NPK Gübresi Harmanlanmış

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Toplam Azot (N)                                                  | %20  |
| Nitrat Azotu (N)                                                 | %5.8 |
| Amonyum Azotu (N)                                                | %4.4 |
| Üre Azotu (N)                                                    | %9.8 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve                                         |      |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | %20  |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | %20  |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                   | %20  |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )    | %5   |
| pH: 4.8 - 5.8                                                    |      |

Klor içeriği: %0.2

### UYARILAR

- \* Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- \* Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Çocuklardan uzak tutunuz
- \* Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- \* Tıbbi yardım alınız.
- \* Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- \* Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- \* Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- \* Güneş ışığından güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- \* Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık:

Üretim Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.  
Şarj No'su :  
Lisans No : 564  
Tescil No : 11235

### DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

### KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımdan emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

### FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama,hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,  
PE 34 3 AG İNGİLTERE  
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

### İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2  
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR  
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

