

## YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

| BİTKİ                                                                          | UYGULAMA ZAMANI                                                                        | DOZU               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nectarin, Kiraz, Vişne      | İlkbaharda gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama          | 125-250gr/100lt su |
| Bağ                                                                            | Çiçeklenmeden önce 1. uygulama<br>Meyve tutumundan sonra 3. uygulama                   | 125-250gr/100lt su |
| Zeytin                                                                         | Bitki gelişim dönemlerinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                 | 125-250gr/100lt su |
| Narenciye, Çay, Muz                                                            | İlkbaharda gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama          | 125-250gr/100lt su |
| Antep fıstığı, Badem, Fındık                                                   | Yapraklanma ile başlanır 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama                                | 125-250gr/100lt su |
| Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar          | Ekimden yaklaşık 3 hafta sonra erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama     | 100-200gr/dekara   |
| Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek                                      | Erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                    | 100-200gr/dekara   |
| Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık                   | Şaşırtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftalık iken başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 100-200gr/dekara   |
| Çilek                                                                          | İlk tomurcuklar görüldüğünde 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama                             | 100-200gr/dekara   |
| Kavun, Karpuz                                                                  | Şaşırtmadan sonra başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama                                 | 100-200gr/dekara   |
| Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı                                                  | Gelişme devresinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama                               | 100-200gr/dekara   |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren başlayarak 10 gün ara ile 2-3 uygulama          | 100-200gr/dekara   |
| Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik                                            | Kardeşlenme döneminde 1-2 uygulama                                                     | 100-200gr/dekara   |

## TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI (Damlama Sulama)

Topraktan sulama suyu ile 350-1250gr/dekar/gün olarak uygulanır.

Bu dozlar tavsiye amaçlı olup, tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişme durumuna göre değişiklik gösterir.



# Adept Power

NP Gübresi Harmanlanmış

## 38-10-0

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Toplam Azot (N)                                                 | %38   |
| Üre Azotu (N)                                                   | %38   |
| Nötral Amonyum Sitrat ve                                        |       |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | %10   |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | %9,50 |

w/w

## UYARILAR

- \* Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- \* Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Çocuklardan uzak tutunuz
- \* Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- \* Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- \* Tıbbi yardım alınız.
- \* Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- \* Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- \* Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- \* Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 31822

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

**Adept Power 38-10-0**, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımdan emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept Power 38-10-0** 'ın bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED  
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,  
PE 34 3 AG ENGLAND  
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI  
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler  
Karşıyaka / İZMİR  
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

