

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DOZU
Bağ	Uyanma-çiçeklenme dönemi arasında 2. daneler saçma iriliğinde iken 1. ince koruk ve ben düşme dönemlerinde uygulama	125-200 ml/100 lt su
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ile 3 uygulama yapılır.	125-200 ml/100 lt su
Zeytin	Çiçeklenme öncesi 1. çiçek sonrası sert çekirdek dönemine kadar 7-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	125-200 ml/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	Gelişme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	125-200 ml/100 lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçek öncesi ve meyve tutum dönemlerinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	125-200 ml/100 lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile toplam 3-4 uygulama	100-150 ml/da
İspanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul Lahana, , Enginar	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Patates, Soğan, Havuç	Gelişme döneminden itibaren 7-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Çilek	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Şeker Pancarı	4-6 yapraklı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Pamuk, Tütün, Şerbetçiotu Yer Fıstığı, Soya fasulyesi Ayçiçeği, Kolza	Gelişme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Çimlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/da
Süs Bitkileri, Çim	Gelişme döneminden itibaren 7-15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-200 ml/100 lt su

Toprakten veya Damlama ile Uygulama Dozu : 2-3lt/da



ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

Adept Seastar F

Sıvı Deniz Yosunu

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Organik Madde
Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
pH : 5.0 - 7.0
Maksimum EC : 3.00 dS/m

w/w

%5
%0,3
%0,9

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Korumacı eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmasını tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 896
Tescil No : 8909

DEPOLAMA :
Depolama sıcaklığı : +4 / + 40°C

KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
1671 Sokak No:2/1 EMİN ÖNAL APT.
A Blok - Kat : 1 D:2
35600-Bahçelievler - Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

