

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Kavun, Karpuz	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama	100-200ml/dekara

EC FERTİLİZER

PK Gübre Çözeltisi

Adept V-Grow

0 - 18 - 16 + ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)
Suda çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Suda çözünür Bakır (Cu)
Suda çözünür Mangan (Mn)
Suda çözünür Çinko (Zn)

w/w
%18
%16
%0.4
%0.2
%1

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No :

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Adept V-Grow, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımından emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir

FİRMA BEYANI:

Firma, Adept V-Grow 'un bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG ENGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 8001 Sokak No : 2

Kemalpaşa / İzmir

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

