

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Uyanma döneminden başlayarak çiçeklenmeye kadar 2 uygulama, daneler saçma iriliğinde iken 1 olmak üzere 3 uygulamaya	100-200ml/100lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve oluşum devresinde olmak üzere 3 uygulama	100-200ml/100lt su
Zeytin	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/100lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100ml/da
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Maydonoz, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100ml/da
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100ml/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Çimlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	50-100ml/da
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100ml/da
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100ml/da
Süs Bitkileri, Çim	Gelişme devresinde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Çiçek öncesi, çiçek ve meyve oluşum devresinde olmak üzere 2-3 uygulama	100-200ml/100lt su
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	4-6 yaprak devresi ilk uygulama 15 gün arayla 2 uygulama	50-100ml/da
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	4-6 yaprak dönemden itibaren 15 gün arayla 2-3 uygulama	50-100ml/da

EC FERTİLİZER

Bakır (Cu-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

Adept Z-Max

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür Bakır (Cu)
Suda çözünür Çinko (Zn)

w/w

%2

%3.5



Tahriş Edici

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No :

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞILIRLIK :

Adept Z-Max, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.

Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Karışımından emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept Z-Max** 'in bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG ENGLAND

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 8001. Sokak No : 2

Kemalpaşa / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

