

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Bağ	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Hasattan 5-6 hafta önce 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Çilek	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Kavun, Karpuz	Meyve tutumundan itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı dönemden itibaren 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Pamuk, Soya, Fasulyesi, Mısır, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Serbetçotu	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Sapa kalıma ve başaklanma döneminde 1 hafta ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Damlama sulama ile 1.5-3 Kg / Da dozda uygulama yapılır.
Uygulama zamanı yaprakdan uygulama ile aynıdır.



EC FERTİLİZER

**HEROCRIS HIGH K
20-5-25+10So₃+TE
NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot (N)	%20
Nitrat Azotu (N)	%6.9
Amonyum Azotu (N)	%4.6
Üre Azotu (N)	%8.5
Nötral Amonyum Sitrata ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (S ₂)	%10
Suda Çözünür Bor (B)	%0.04
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0.02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0.002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.04

UYARILAR

Asla uygun doz oranını aşmayınız.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çocuklardan uzak tutunuz

Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

Tıbbi yardım alınız

Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.

Konuyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.

Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.

Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No :

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı + 5 / + 40° C olmalıdır.

KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karışımdan emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ :

HEROGRAS ESPECIALES S.L.

Poligono Industrial Juncaril, Calle Loja s/n 18220 Albolote GRANADA (Spain)

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17