

HEROFOL MAGNESIO B + Zn

EC FERTİLİZER MAGNEZYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER	w/w
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %20	
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %35	
Suda Çözünür Bor (B) %4	
Suda Çözünür Çinko (Zn) %4	

UYARILAR

Asla uygun doz oranını aşmayınız.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Çocuklardan uzak tutunuz Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
Tıbbi yardım alınız.
Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	1. Çiçek öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	150-300 gr / 100 lt su
Zeytin	1. Çiçek öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	150-300 gr / 100 lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz	1. Çiçek öncesi 2. Meyve oluşum dönemi 3. Hasat sonrası ve yaprak dökümünden önce	150-300 gr / 100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	1. Çiçek öncesi 2. Meyve oluşum dönemi 3. Hasat sonrası ve yaprak dökümünden önce	150-300 gr / 100 lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	1. Çiçeklenme öncesinde 2. Meyve oluşum devresinde	150-300 gr / 100 lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	1. Erken gelişme devresi 2. Çiçek öncesi 3. Çiçek sonrası	100-200 gr / dekara
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	1. 6-8 yapraklı dönemde 2. Meyve oluşum döneminde	100-200 gr / dekara
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Maydonoz, Enginar	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr / dekara
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	1. Şaşırtmadan sonra 2. Çiçeklenme öncesi 3. Çiçeklenme sonrası	100-200 gr / dekara
Çilek	1. Şaşırtmadan sonra 2. Çiçeklenme öncesi 3. Çiçeklenme sonrası	100-200 gr / dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	1. 6-8 yapraklı dönemde 2. uygulama 15 gün sonra	100-200 gr / dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	1. 4-6 yapraklı devrede 2. uygulama 15 gün sonra	100-200 gr / dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çekirdek	Kardeşlenme öncesi ve sonrası 2 uygulama, Mısırdaki gelişme devresinde 2 uygulama	100-200 gr / dekara

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden
itibaren 3 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No : 38294

DEPOLAMA :
Depolama sıcaklığı + 5 / + 40° C olmalıdır.
KARİŞİLEBİLİRLİK :
Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. Karıştırdan emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:
Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.
ÜRETİCİ :
HEROĞRA ESPECIALES S.L. Poligono Industrial Juncaril, Calle Loja s/n 18220 Albolote GRANADA İSPANYA
İTHALATÇI :
SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Ören 75.Yıl Cumhuriyet mah. 8001 Sokak
No: 2 Kemalpaşa-İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22



Responsable del producto / Product-responsible company: Heroğra Especiales S.L.
Pol. Ind. Juncaril - C/ Loja s/n - 18220 ALBOLOTE (Granada) ESPAÑA - info@heroğra.com - Tel.: +34 958 49 00 07
www.HEROĞRAESPECIALES.COM